

Quand votre enfant peut-il recommencer à manger ?

Environ une heure après l'opération, le médecin décide si l'enfant est apte à boire. Si l'avis est positif, l'infirmière lui apportera de l'eau et, ensuite, son repas.



À la maison

De retour à la maison, nous vous demandons de bien vouloir suivre les conseils du médecin et d'appliquer les recommandations de l'infirmière. Celle-ci vous aura montré comment appliquer une pommade antiseptique sur l'incision. Les points de suture tombent d'eux-mêmes et ne nécessitent donc pas d'être enlevés.



La circoncision

EpiCURA
mon hôpital

Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be

EpiCURA
mon hôpital

La circoncision consiste à enlever la peau du prépuce de façon à exposer le gland du pénis. Cette intervention est pratiquée sous anesthésie générale.

Dans quels cas pratique-t-on la circoncision ?

- Convictions religieuses
- Motif esthétique
- Motif médical (infection, rétrécissement du prépuce, urètre ne se trouvant pas à l'extrémité du pénis).



Ne vous inquiétez pas si votre enfant est encore un peu agité lorsqu'il regagne sa chambre. Il garde la perfusion jusqu'à sa sortie de l'hôpital afin de lui administrer ses antidouleurs et d'autres médicaments si nécessaire. Il reste à l'hôpital de jour jusqu'au passage du chirurgien.

L'enfant est plus à l'aise s'il porte des sous-vêtements et un pantalon amples (training, pyjama). Emportez avec vous des langes adaptés à la taille de l'enfant ou légèrement plus grands.

Le déroulement de l'opération

1. Quelques jours avant l'opération

- L'anesthésiste et le pédiatre, accompagnés de l'infirmière, vous posent des questions sur votre enfant afin que l'intervention se déroule au mieux.
- Vous vous rendez au laboratoire pour faire faire une prise de sang à l'enfant.

2. La veille de l'opération

- Veillez à ce que votre enfant reste à jeun. Il ne doit plus boire ni manger à partir de minuit.

3. Le jour de l'opération

- Procédez à l'admission de votre enfant (1^{er} étage du site de Baudour).
- Rendez-vous ensuite à l'hôpital de jour pédiatrique (4^e étage). Votre enfant est installé dans une chambre. Une infirmière prend sa température et vérifie qu'il est bien à jeun.

4. Avant l'entrée en salle d'opération

- L'infirmière enfile une blouse d'opéré à l'enfant et lui remet un bracelet d'identification.
- Votre enfant reçoit un médicament sous forme de suppositoire, gouttes ou sirop (prémédication) afin de l'apaiser. Il peut ensuite descendre en salle d'opération. Vous pouvez l'y accompagner jusqu'à l'ascenseur mais votre présence n'est pas autorisée en salle d'opération ni en salle de réveil. Notre personnel veille sur lui en votre absence.

5. L'opération

- Dans la salle, l'anesthésiste endort votre enfant à l'aide d'un masque. Il ne ressent aucune douleur.
- Une fois endormi, votre enfant reste sous surveillance grâce au monitoring.

6. Après l'opération

- L'enfant est transféré en salle de réveil. Le personnel lui administre des antidouleurs grâce à la perfusion.
- L'anesthésiste décide à quel moment il peut quitter la salle de réveil et revenir près de vous dans sa chambre.

